

Vaccinations program för äldre

221110

Bengt Wittesjö

Smittskyddsläkare



REGION
BLEKINGE

Influensa vaccinationstäckning 65+ 21/22

- Blekinge: 70 %
- Riket: 70 %
- Gotland, Kronoberg, Uppsala, Värmland, Västerbotten, VGR, Örebro: 75 %
- Vaccinationsstart 22/23 tisd 8/11

WHO recommends
at least 75%
of older people
get vaccinated against
influenza.

WHO/Europe 🌐 @WHO_Europe · 20h

Replying to @WHO_Europe

WHO recommends at least 75% of older people get vaccinated against #influenza but in 1/2 of European countries fewer than 1 in 3 actually do.

WHO, ECDC, WHO at the EU and 4 others



World Health
Organization
REGIONAL OFFICE FOR
Europe



- Alla >65
- Gravida fr v 12 (eller tidigare om riskgrupp enl nedan), helst före 4 v före beräknad partus
- Vuxna och barn >6 mån
 - Kronisk hjärtsjukdom
 - Kronisk lungsjukdom (KOL, svår/instabil astma)
 - Andra tillstånd med nedsatt lungfunktion (exv fetma)
 - Kronisk lever- och njursvikt
 - Diabetes mellitus
 - Andra av läkare bedömd riskgrupp
 - Kraftigt nedsatt immunförsvar (stamcellstransplanterade, leukemi, organtransplanterade)*
 - Hushållskontakter till ovanstående*
- Personal inom HoS/omsorg (säbo/hemtjänst)

Pneumokockvaccin


Pneumovax

- 1) >65 år
- 2) 75-åringar födda 1947 eller senare inom särskilt vaccinationsprogram 1/12 -22
- 3) Kronisk hjärtsjukdom
- 4) Kronisk/neysatt lungsjukdom
- 5) Kronisk lever- och njursjukdom
- 6) Diabetes mellitus
- 7) Efter läkarbedömning: Alkohol-/drogmissbruk, rökare och svetsare

Covid påfyllnadsdos

- Avtagande effekt efter 4 månader
- Rekommenderas för riskgrupper och 65+, erbjuds övriga friska 18+, framför allt 50+
- Blekingerekommendation: Personal inom vård och omsorg samt närstående till riskgrupperna
- Påfyllnadsdos med BA.4/5-vaccinet (aktuell variant), dos 1 och 2 med ursprungsvaccinet (Wuhan)
- Går att kombinera med pneumokock-, kikhoste- och influensa-vaccin
- Man kan vänta upp till 3 månader mellan infektion och påfyllnadsdos

Andel vaccinerade med dos 4 eller 5 sedan v 34 2022 V 42




Blekinge:
10 resp 57 %


TBE

- Fyra fall hittills under 2022
- Riskområden Aspö och Ryssberget
- Grundvaccination
 - ✓ <50 år: 0, 1, 12 månader
 - ✓ >50år: 0, 1, 3, 12 månader
- Påfyllnad: 3 år och därefter vart 5:e år
- Kan ges samtidigt med covid- och influensavaccin

TBE-fall 2000 - 2022

Fall






TBE-karta

Kartan visar TBE-fall i Blekinge från 1999 och framåt.

- = Säker eller sannolik smittort åren 1999-2009.
- = Säker eller sannolik smittort åren 2010-2019.
- = Säker eller sannolik smittort åren 2020-2029.
- = Särskilt utsatta områden.



Vaccin mot bältros

- Förhindra aktivering av "sovande" vattkoppsvirus
- Minskar risken för kroniskt smärttillstånd (postherpetisk smärta)
- Zostavax (en dos) – 1224 kr (fri prissättning)
- Shingrix (två doser) – 2*2679 kr (fri prissättning)
- Betala själv
- Utredning pågår hos Folkhälsomyndigheten

Kostnad vacciner

- Beslut RF 22/9 -21: Avgiftsfri vaccination mot influensa för alla riskgrupper, oavsett ålder
- Efter rekommendation från SKR beslut RF 21-22/6 - 22: Avgiftsfri vaccination, oavsett ålder efter medicinsk bedömning mot mässling, röda hund, polio, stelkramp, difteri och kikhosta
- Beslut RF 12/10 -22: Avgiftsfri vaccination mot pneumokocker för alla riskgrupper, oavsett ålder och vaccin. Gäller fr o m 17/10 -22.